

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE

EDITION DE LA STATION "AQUITAINE"

GIRONDE, DORDOGNE, LOT-&GARONNE, LANDES, PYRÉNÉES-ATLANTIQUES

SERVICE DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX

B. P. N° 47 - 33150 CENON-LA MORLETTE - TÉL. (56) 86.22.75 - 86.24.35

INSEE : 33244253-00016 - INSCRIPTION A LA C.A.P.P.P. N° 524 AD

ABONNEMENT ANNUEL

60,00 FRANCS

Sous-Régisseur d'Avances et de Recettes,
Direction Départementale de l'Agriculture

C. C. P. : BORDEAUX 6702-46 X

23 NOVEMBRE 1979 - BULLETIN TECHNIQUE N° 27

Aux Mairies abonnées aux bulletins
techniques de la Station "AQUITAINE"

Nous demandons à toutes les mairies intéressées
par l'abonnement en 1980 aux bulletins techniques édités
par la Station d'Avertissements Agricoles "AQUITAINE" de
bien vouloir nous adresser avant le 15 FEVRIER 1980 un
bon de commande pour le nombre d'exemplaires désirés.

Dès réception de ce bon de commande nous vous
adresserons un mémoire en double exemplaire pour le mon-
tant de votre abonnement.

Pour les réabonnements personnels aux avertisse-
ments agricoles, attendre la réception du bulletin spécial
fixant les modalités qui sera adressé fin décembre.

ARBORICULTURE

FEU BACTERIEN

Dans les communes ci-après :

- Lot-et-Garonne : Aiguillon Buzet-sur-Baïse, Damazan, Galapian, Lagarrigue, Razimet, Saint-Léger,
- Landes : Bonnegarde, Cauneilles, Estibeaux, Gaas, Habas, Labatut, Mouscardes, Port-de-Lanne, Saint-Etienne d'Orthe,
- Gironde : Loupiac,
- Pyrénées Atlantiques : Labastide Villefranche, Lahontan,

et dans toutes les communes limitrophes, il est rappelé l'importance que revêt la désinfection des outils de taille, au début des travaux, après chaque parcelle et au moins deux fois par jour dans tous les vergers de pommiers et de poiriers de la zone mentionnée ci-dessus.

P 338

.../...

Dans toute la circonscription "Aquitaine", il est souhaitable de faire désinfecter avant le début des travaux les sécateurs de toutes les équipes de taille venant de l'extérieur. Il est recommandé de renouveler cette opération à la fin de la taille de chaque parcelle de poiriers. Cette désinfection peut s'effectuer par un bref trempage des outils dans un récipient contenant de l'alcool à brûler.

Dans le secteur contaminé, il sera nécessaire d'appliquer dès que possible après les opérations de taille, un traitement au cuivre, de préférence sous forme de bouillie bordelaise à la dose de 500 grammes de cuivre métal par hectolitre d'eau soit 2500 g de produit commercial/hl si on utilise une spécialité titrant 20 % de cuivre métal ou 2000 g de produit commercial/hl si la spécialité dose 25 % de cuivre métal.

GRANDES CULTURES

BLE D'HIVER

Désherbage en début d'hiver

Trois époques peuvent être retenues pour le désherbage des céréales d'hiver : avant le semis, entre le semis et la levée, en postlevée. Dans ce dernier cas on peut traiter en postlevée précoce (début d'hiver) ou en fin d'hiver.

Dans de nombreuses parcelles de blé parvenues aux stades 1 à 3 feuilles, les agriculteurs peuvent envisager un désherbage en postlevée précoce, soit parcequ'ils préfèrent cette période qui leur permet de choisir l'herbicide en fonction des mauvaises herbes déjà levées et tout en ne sachant pas ce que réservera la fin d'hiver (par exemple les pluies et le froid de mars 1979), soit parce que la pluviométrie des deux premières décades de novembre a empêché la réalisation du désherbage de prélevée (96 mm de pluie du 1er au 20 novembre à Cenon soit la pluviométrie normale du mois entier).

Il faut cependant éviter de désherber avant une période de froid

1) Du stade "1 feuille" au stade "3 feuilles"

- néburon + nitrofène : 7 kg/ha d'Herbalt ou Herbal S - Inefficace contre folle-avoine.

2) Du stade "1 feuille" à 1 talle

- chlortoluron : 5 l/ha de Dicuran autosuspensible ou de Chlortocide EL ou 3 kg/ha de Chlortocide ou 12,5 kg/ha de Dicuran microsec (microgranulés)/. Utilisable également sur orge d'hiver et efficace sur paturin, ray-grass, vulpin et agrostide, irrégulier sur folle-avoine. Consulter la notice du fabricant bien que les variétés couramment employées en Aquitaine ne soient pas sensibles à ce produit.

3) Du stade "3 feuilles" à 1 talle

- néburon + huile : 10 l/ha de Cerepron NB - Inefficace sur folle-avoine, paturin et ray-grass, mais efficace sur vulpin - Utilisable sur orge d'hiver

- néburon + isoproturon : 6 à 7 kg de Prodix également utilisable sur orge d'hiver. Efficace contre folle-avoine, paturin et vulpin, mais irrégulier sur ray-grass.

Imprimerie de la Station
de Bordeaux
Directeur-Gérant : P. JOURNET

L'Ingénieur en Chef d'Agronomie
Chef de la circonscription phytosanitaire
"AQUITAINE"
M. LARGE